

100

N^o 66

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2

Président : Monsieur le Professeur LEMENAGER



Reproduction du sceau original de la faculté de Médecine de CAEN, fondée en 1438



Par délibération en date du 29 Mars 1969, la Faculté a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation, ni improbation.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550815_0004

[illegible]

PROFESSEURS

MM. PORIN	Clinique médicale A
BONNET	Clinique obstétricale
FOUCAULT	Pathologie expérimentale
GUIBE	Clinique chirurgicale A
GUIHARD	Pédiatrie
LACROIX	Clinique et pathologie chirurgicales B
LEMAIRE	Physiologie
LEMENAGER	Séméiologie
LHIRONDEL	Clinique médicale infantile
OLIVIER	Clinique médicale B
PHELINE	Anatomie
POULAIN	Médecine opératoire
SAVINI	Pharmacologie
VALLA	Médecine générale et thérapeutique
VILLEY	Clinique médicale C

PROFESSEURS SANS CHAIRE

MM. FABRE	Physiologie
POILPRE	Psychiatrie

MAITRES DE CONFERENCES AGREGES

MM. BAZIN	Thérapeutique, réanimation médicale
BEUVE-MERY	Médecine interne
BRION	Psychiatrie
DAVERNE	Electro-radiologie
DESCHAMPS	Dermatologie
DROSDOWSKY	Biochimie médicale
EVARD	Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
FERNANDEZ	Physique médicale
GAUBERTI	Médecine préventive et santé publique, hygiène
GIGNOUX	Chirurgie générale
IZARD	Histologie et embryologie
LECHEVALIER	Neurologie
LEVY	Gynécologie et obstétrique
LOYAU	Rhumatologie
MOREL	Bactériologie, parasitologie, virologie
MORIN	Neurologie
MOULIN	Pharmacologie
QUESNEL	Anesthésiologie
ROUSSELOT	Anatomie pathologique
THERET	Histologie et embryologie
THOMAS	Immunologie, hématologie
VENEZIA	Pédiatrie

A mon Oncle,

A ma Tante,

Avec toute ma gratitude et
mon affection.

A mon Mari,

A mon Fils.

A Monsieur le Professeur LEMENAGER,

Mon Maître et Président de thèse,

qui m'a inspiré le sujet de
ce travail,

Avec toute ma reconnaissance.

A Monsieur le Docteur ABBATUCCI

qui nous a permis de consulter
ses nombreux dossiers,

Avec tous mes remerciements.

A Monsieur le Professeur Agrégé MOREL,

A Monsieur le Professeur Agrégé THOMAS,

Toute ma gratitude.

A mes Maîtres d'Externat,

Monsieur le Professeur Agrégé CATTAN,
Monsieur le Professeur Agrégé DESCHAMPS,
Monsieur le Professeur Agrégé FOUCAULT,
Monsieur le Professeur GUIBE,
Monsieur le Professeur GUIHARD,
Monsieur le Professeur LHIRONDEL,
Monsieur le Professeur Agrégé MORIN,
Monsieur le Professeur OLIVIER,
Monsieur le Professeur POILPRE.

A Monsieur le Docteur PIEPLU,
Chef de Clinique,

A Monsieur le Docteur BENARD,
Chef de Clinique,

A Monsieur le Docteur TANGUY,
Chef de Clinique,

ma reconnaissance et ma respectueuse amitié.

A mes BEAUX-PARENTS,

A mes AMIS,

Aux Infirmières, Aides-soignantes et Secrétaires avec qui
j'ai travaillé.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240

I N T R O D U C T I O N

Le temps n'est plus où EWING remarquait que la tuberculose suivait "comme son ombre" la maladie de Hodgkin. Mais il n'en reste pas moins que la tuberculose conserve une affinité particulière pour la lymphogranulomatose maligne, et que si sa fréquence a été considérablement réduite dans cette maladie, cette réduction est parallèle à la régression de la tuberculose dans la population en général. Régression due aux progrès thérapeutiques mais surtout à une prophylaxie qui, pour n'être pas parfaite, a amené un progrès réel.

Pourquoi cette affinité ?

La tuberculose, tout comme d'autres infections bactériennes, virales, parasitaires, mycosiques, trouve un terrain d'élection chez le hodgkinien. Après avoir suggéré une origine tuberculeuse à la maladie de Hodgkin, les auteurs s'accordent maintenant pour dire que la maladie de Hodgkin, maladie du système réticulo-endothélial, entraîne une baisse des défenses vis-à-vis des infections et notamment de la tuberculose. A cet aspect lié au processus malin s'ajoutent divers facteurs dus à une dépression des défenses générales ou une altération de certains tissus par les thérapeutiques.

Reprenant huit observations de tuberculose associée à une maladie de Hodgkin, nous nous proposons à la suite de notre Maître le Professeur LEMENAGER et du Docteur ABBATUCCI de revoir la nature et le pourquoi de cette "relation privilégiée" entre ces deux maladies.

S O M M A I R E

Introduction (P.1)

Sommaire (P.2)

PREMIERE PARTIE

L'affinité entre Tuberculose et Maladie de Hodgkin est réelle, mais ce sont deux maladies différentes (P.4)

Chapitre I : LA TUBERCULOSE EST PLUS FREQUENTE CHEZ LE HODGKINIEN QUE DANS UNE POPULATION TEMOIN (P.5)

Chapitre II : LA TUBERCULOSE ET LA MALADIE DE HODGKIN SONT DEUX MALADIES DIFFERENTES (P.12)

DEUXIEME PARTIE

Observations personnelles (P.16)

TROISIEME PARTIE

La Maladie de Hodgkin favorise la Tuberculose mais aussi d'autres infections (P.33)

Chapitre I : ELEMENTS FAVORISANT LA TUBERCULOSE AU COURS DE LA MALADIE DE HODGKIN (P.34)

A) La maladie de Hodgkin diminue les défenses de l'organisme vis-à-vis de la Tuberculose (P.35)

B) La thérapeutique du Hodgkin peut préparer le terrain à une infection tuberculeuse (P.42)

C) Une maladie de Hodgkin peut réveiller une Tuberculose ancienne guérie ou passée inaperçue (P.44)

Chapitre II : PLACE DE LA TUBERCULOSE PARMI LES ACCIDENTS INFECTIEUX AU COURS DE LA MALADIE DE HODGKIN (P.46)

Conclusions (P.52)

Bibliographie (P.55)

- : - : - : - : -

- PREMIERE PARTIE -

L'AFFINITE

ENTRE TUBERCULOSE ET MALADIE DE HODGKIN EST REELLE

MAIS CE SONT DEUX MALADIES DIFFERENTES

=====

~ I ~

La Tuberculose
est plus fréquente chez le Hodgkinien
que dans une population témoin

~:~

Quand il décrivit en 1896 la lymphogranulomatose maligne, STERNBERG en affirma la nature tuberculeuse. Si par la suite de nombreux arguments et travaux permirent d'aller contre cette opinion, il n'en reste pas moins que dès les premières descriptions de la maladie, l'accent avait été mis sur la "relation privilégiée" qui l'unit à la tuberculose.

Le but de ce chapitre est d'apporter brièvement quelques données statistiques afin d'illustrer et de rendre évidente cette "relation privilégiée" entre les deux maladies. Ces données sont résumées dans le tableau I (page II) où sont comparées trois informations : le taux de tuberculose au cours de la maladie de Hodgkin (ou morbidité tuberculeuse chez les hodgekiniens), la morbidité tuberculeuse dans une population dite normale et la mortalité tuberculeuse dans cette même population.

A - LA VALEUR DE CES INFORMATIONS :

La morbidité tuberculeuse chez les hodgekiniens est facile à préciser car, une fois recensée, la population étudiée l'est avec beaucoup plus de précision et ceci pour deux raisons : d'une part, il s'agit d'une population peu nombreuse, homogène, dans la mesure où elle se définit par rapport à un cadre clinique bien précis; d'autre part, l'attention des médecins est fortement retenue par la recherche d'une tuberculose sur un tel terrain, beaucoup plus que pour l'étude de la morbidité tuberculeuse dans une population témoin, ne serait-ce que par la complexité des moyens à mettre en oeuvre dans le second cas. Ce qui peut prêter à discussion, ce sont les critères retenus pour porter le diagnostic de tuberculose. Il convient en effet de préciser la chronologie des deux affections et il est évi-

dent que les chiffres ne seront pas les mêmes si le critère de diagnostic est la seule émission de BK., ou bien la constatation d'une image radiologique "spécifique" (bacillifère ou non), ou bien encore l'étude anatomo-pathologique après autopsie.

La connaissance de la morbidité tuberculeuse se heurte à de nombreux obstacles quand elle concerne une population dite normale, une nation par exemple. Notamment en France où l'on ne dispose pas, en dépit de l'obligation légale de déclarer tous les cas de tuberculose, d'information précise à ce sujet. De plus, la morbidité tuberculeuse n'est pas la même d'un pays à l'autre, et si l'on veut bien préciser la fréquence relative de la tuberculose dans la maladie de Hodgkin, il importe de comparer des chiffres correspondant à une même nation. Il existe plusieurs manières de chiffrer cette morbidité tuberculeuse d'une nation. Nous en avons retenu deux. La première correspond au recensement des nouveaux cas de tuberculose au cours d'une année dans un pays donné. La deuxième retient comme critère l'indice tuberculinique des sujets jeunes. On évalue par là le pourcentage de sujets d'un âge donné, non vaccinés mais naturellement allergiques à la tuberculine, ce qui permet d'évaluer indirectement la morbidité tuberculeuse d'un secteur.

Le bilan de la tuberculose est traditionnellement établi d'après le taux de mortalité tuberculeuse enregistrée par l'O.M.S. Nous possédons des chiffres beaucoup plus précis et plus abondants. Mais si le taux de mortalité permet d'apprécier l'évolution de cette mortalité, il n'est en rien évident que les deux courbes de mortalité et de morbidité soient parallèles.

Enfin, la décroissance de la tuberculose est rapide, comme nous allons le voir, et les chiffres varient

d'une année à l'autre. Il importe donc de comparer avec prudence les chiffres d'une étude portant sur 20 ans de la morbidité tuberculeuse dans la maladie de Hodgkin à ceux de la morbidité tuberculeuse de la population dans l'année correspondant à la parution des résultats de l'étude.

B - ANALYSE DE CES INFORMATIONS .

Deux faits bruts se dégagent de l'analyse du tableau I (page II). Premièrement, il apparaît à l'évidence que la tuberculose est beaucoup plus fréquente au cours de la maladie de Hodgkin que dans la population. Deuxièmement, la fréquence de la tuberculose, tant chez les hodgekiniens que dans la population n'a cessé de décroître au cours des dernières décennies. Dans ces deux catégories, la décroissance relève des mêmes raisons : avènement d'une thérapeutique efficace au cours de l'après-guerre, meilleure prophylaxie collective, que ce soit par le blanchissage des tuberculeux ou le dépistage individuel et collectif ou la prophylaxie individuelle par le B.C.G., ce deuxième point représentant, par ailleurs, un argument de taille en faveur de la dualité des deux affections.

En 1932, PARKER relevait 30 % de cas de tuberculose au cours de la maladie de Hodgkin. Ce taux s'abaisse à 20 % en 1947 dans une étude de CHASE puis, pour le même auteur, à 5,1 en 1959. ARDEN et ROTTINO relèvent sur une période de vingt ans, de 1946 à 1966, dans une étude portant sur 162 maladies de Hodgkin autopsiées, cinq tuberculoses pulmonaires, toutes miliaires, outre deux maladies de Hodgkin latentes découvertes à l'autopsie de deux tuberculeux pulmonaires. Le taux de morbidité tuberculeuse chez les hodgekiniens sur cette tranche de vingt ans est ainsi de 3 %. Un travail de CASAZZA, publié en 1965 et portant sur 51 autopsies de maladie de Hodgkin ne révèle qu'un cas de tuberculose (2 %).

En France, les constatations sont similaires. En 1953, MARCHAL retrouve 4 tuberculeux sur 29 hodgkiniens traités par l'ACTH. ou l'hydrocortisone, soit 14 %.

LEMENAGER et ABBATUCCI, sur 142 dossiers de hodgkiniens examinés, relèvent 8 cas de tuberculose, soit 5,6 %, ces dossiers correspondent à la période allant de 1958 à 1970.

Enfin, HOERNI, en 1971, sur 142 dossiers de maladie de Hodgkin recueillis à la Fondation Bergonié de 1960 à 1969, ne retrouve qu'une seule tuberculose sur des critères de diagnostic clinique et bactériologique.

A l'Institut Pasteur de LILLE, CALMETTE en 1910, puis GUERNEYRIEUX en 1950, trouvent un indice tuberculinique de 89 % puis de 49 % chez les jeunes lillois de plus de 15 ans. Le seul renseignement que l'on puisse retirer de ces deux chiffres est le recul de l'indice tuberculinique en 40 ans, qui pourrait correspondre à une décroissance parallèle de la tuberculose dans la lymphogranulomatose maligne. Encore peut-on observer que le chiffre de 49 % est élevé. Il en est de même à la faculté de médecine de LILLE où, vers l'âge de 20 ans, la proportion des étudiants non vaccinés naturellement allergiques à la tuberculine s'élevait encore, en 1970, à 57 % à l'entrée dans la vie universitaire. De tels coefficients traduisent la persistance dans notre pays d'un niveau élevé d'endémie tuberculeuse si on les compare à celui de 6 % constaté en 1966 chez les jeunes soldats aux Pays-Bas. D'ailleurs, cette notion pourrait être étayée par le taux de tuberculose relativement élevé trouvé par LEMENAGER dans son étude de 142 dossiers de Hodgkin (5,6 %).

Enfin, l'estimation des nouveaux cas de tuberculose en France en 1967 (120 pour 100.000 habitants), comparée au chiffre fourni par l'O.M.S. pour les U.S.A. en 1968, (21) ne fait que confirmer ce fait.

L'analyse comparée des taux de mortalité tuberculeuse en France et aux U.S.A. fait bien apparaître la différence entre les deux pays, mais aussi le net recul de l'affection tuberculeuse.

~ ~ ~

DATE ET ORIGINES			TAUX DE MORBIDITE			TAUX DE MORTALITE	
DES INFORMATIONS			Au cours de la Maladie de Hodgkin en %	Dans la population		pour 100.000 habitants d'après l'O.M.S.	
Années	Auteurs	Pays		Indice Tuberculo-lique en %	Nouveaux cas de Tuberculose pour 100.000		
1908	O.M.S.	-	-	-	-	225	164
1910	Inst. Pasteur LILLE	FR.	-	89	-	-	-
1932	PARKER	USA.	30	-	-	135	60
1947	CHASE	USA.	20	-	-	74	29
1950	Inst. Pasteur LILLE	FR.	-	49	-	-	-
1953	MARCHAL	FR.	14	-	-	40	15
1959	CHASE	USA.	5,1	-	-	24	6
1966	ARDEN	USA.	3	-	-	-	-
1966	CASAZZA	USA.	2	-	-	16	5
1967	Estimation	FR.	-	-	120	-	-
1968	O.M.S.	USA.	-	-	21	-	-
1970	LEMENAGER	FR.	5,6	-	-	8,2	3
1971	HOERNI	FR.	0,7	-	-	-	-

TABLEAU I

~ II ~

La Tuberculose et la Maladie de Hodgkin
sont deux maladies différentes

~ ~

~ I2 ~

Malgré son extension progressive et son caractère le plus souvent fatal, la maladie de Hodgkin présente, dans la plupart de ses formes, des signes d'allure inflammatoire qui n'ont pas manqué de frapper les premiers observateurs.

Ces signes sont non seulement cliniques, avec la fièvre ondulante ou intermittente, évocatrice d'une septicémie, mais aussi biologiques et histologiques.

La vitesse de sédimentation est constamment accélérée au cours des poussées évolutives de la maladie. Les gamma globulines sont augmentées à l'électrophorèse au début de l'évolution et le taux sanguin du fibrinogène est élevé.

Mais l'histologie est encore plus convaincante, avec le granulome, si souvent mêlé aux lésions, composé de polynucléaires et de plasmocytes, avec une fibrose précoce, ces deux signes étant les compagnons habituels des réactions inflammatoires.

On comprend ainsi que la démarche de STERNBERG décrivant les caractères histologiques particuliers de la maladie de Hodgkin, l'ait amené à affirmer la nature tuberculeuse de la lymphogranulomatose maligne sous le nom de "tuberculose atypique de l'appareil lymphatique évoluant sous le masque d'une pseudo-leucémie".

En faveur de la tuberculose plaidaient de nombreux arguments :

- 1) la tuberculose sous toutes ses formes connues, coexiste fréquemment avec la lymphogranulomatose maligne.
- 2) la tuberculose réalise parfois une lymphadénie généralisée, pauci-bacillaire et sans caséification.

- 3) les lésions granulomateuses et tuberculeuses se juxtaposent et atteignent toutes deux les mêmes organes riches en tissu réticulo-endothélial, tels les ganglions et la rate.
- 4) si dans une grande majorité des cas, l'aspect des cellules géantes de STERNBERG et celui de la cellule géante de LANGHANS est bien différent, les formes de transition ne laissent pas d'être signalées.

De multiples expériences ont été faites, qui ont cru démontrer la tuberculisation du cobaye après injection de produit lymphogranulomateux. L'hypothèse d'un cycle du produit tuberculeux, avec une forme granulaire et filtrante analogue à un virus, tombée dans l'oubli aujourd'hui, a servi de support pour rendre responsable ce même germe des lésions tantôt tuberculeuses et tantôt hodgkiniennes.

L'épidémiologie de la maladie de Hodgkin elle-même a été interprétée en faveur de l'origine microbienne avec la description de cas familiaux, et avec les localisations initiales cervicales ou médiastinales suggérant la pénétration du germe par les voies aéro-digestives supérieures.

Que reste-t-il de tout cela ? Peu de choses car les progrès de la bactériologie ont rendu caduque cette notion de virus filtrant, forme granulaire du BK. Enfin et surtout, les baisses de fréquence parallèles de la tuberculose dans la maladie de Hodgkin et dans la population normale d'une part, et l'effet thérapeutique des antituberculeux sur la seule tuberculose d'autre part, apportent un argument formel en faveur de la dualité des deux maladies. De même, la plus grande fréquence de certaines viroses, mycoses..... laisse à penser que c'est le terrain hodgkinien qui est propice à l'éclosion de ces infections.

Il n'en reste pas moins que l'affinité entre la tuberculose et la maladie de Hodgkin est réelle, et nous nous proposons de l'illustrer par huit observations recueillies au C.A.C. de CAEN et au C.H.U. de CAEN, de 1958 à 1970, dans les services du Docteur ABBATUCCI, Directeur du C.A.C., et de notre Maître, le Professeur LEMENAGER.

~ ~ ~ ~ ~

DEUXIEME PARTIE

OBSERVATIONS PERSONNELLES

=====

OBSERVATION N° I

M A E S. Monique - 26 ans.

Une femme présente, après un an d'évolution d'une maladie de Hodgkin au stade IV, traitée par radio-cobaltothérapie, une tuberculose miliaire disséminée, avec BK. dans les urines entraînant le décès dans les deux mois suivants, malgré un traitement tuberculostatique.

Il s'agissait d'une maladie de Hodgkin à déplétion lymphocytaire classe IV de LUKES avec lymphopénie (300) et cuti-réaction négative. (voir tableau II page suivante).

<u>HODGKIN</u>	<u>TUBERCULOSE</u>	<u>TRAITEMENT DU HODGKIN</u>	<u>HISTOLOGIE ET BIOLOGIE</u>
<u>15.5.1962</u> Adénopathies sus-clavicu- laire droite et inguinales Prurit depuis 4 ans <u>Mars, Avril et Mai 1962 :</u> fièvre ondu- lante hépatospléno- mégalie Lymphogra- phie +  <u>Déclasse la</u> <u>8.8.1963</u>	<u>27.3.1963 :</u> ITN. <u>12.6.1963 :</u> TP miliaire bila- térale <u>3.7.1963 :</u> BK. dans les urines 	<u>20.5 au 25.7.1962 :</u> Radiothérapie (200 KV) <u>Septembre 1962 :</u> Chloraminophène Triamcinolone <u>Octobre 1962 au 28.1.1963 :</u> Cobalt 4000 R sus-diaph. 4000 R sous-diaph.	<u>Dépletion lympho- cytaire</u> <u>30.5.1963</u> Lymphocytes . 300/mm³ <u>7-12.1962 :</u> Cuti-réaction <u>Electrophorèse :</u> P = 58 % Alb = 45 % Glob = α_1 = 10 % α_2 = 18 % β = 14 % γ = 13 %

TABLEAU N° II

OBSERVATION N° II

B A G. François - 52 ans.

Homme avéré bacillaire avec épanchement pleural gauche, BK, dans les urines et tuberculose disséminée, après deux ans d'une chimiothérapie associée aux corticoïdes pour maladie de Hodgkin au stade IV.

Le décès est survenu après deux mois d'évolution de la tuberculose, à la suite d'un ictère qui sembla favorisé par la Rifampicine.

Il s'agissait d'une forme à cellularité mixte avec 1.300 lymphocytes et cuti-réaction négative.

(voir tableau III page suivante).

HODGKIN	TUBERCULOSE	TRAITEMENT DU HODGKIN	HISTOLOGIE ET BIOLOGIE
<u>25.7.1966</u> : Adénopathies cervico-axil- laires Fièvre Amaigrissement	Pollakiurie 	<u>29.7 au</u> <u>13.8.1966</u> : Cortancyl 30 mg/jour	<u>Cellularité mixte</u> <u>Lymphocytes =</u> <u>1300/mm³</u> <u>(26.12.1968)</u>
<u>7.2.1967</u> : Laparotomie : adénopathies mésentériques Scintigramme : lacunes hépa- tiques	<u>15.1.1969</u> : BK. dans urines TP nodulaire bilatérale	<u>23.2 au</u> <u>25.8.1967</u> : Velbé = 5 mg/sem Betnesol = 1 comp/jour	<u>Cuti-Réaction -</u> <u>Electrophorèse :</u> <u>(16.10.1968)</u>
<u>28.3.1967</u> : Lymphogra- phie ++	Rifadine - INH - SM	<u>28.7 au</u> <u>8.9.1967</u> : Velbé = 5 mg/sem Méthotrexate Purinethol Natulan	P = 76 g % Alb = 42 % Glob = α_1 = 6 % α_2 = 14 % β = 15 % γ = 23 %
<u>31.1.1968</u> : Pleurésie lym- phocytaire gau- che regressive	<u>17.1.1969</u> : Ictère	<u>25.10.1967</u> : Velbé = 5 mg/sem Natulan	
<u>19.10.1968</u> : Rechute (lym- phographie)	<u>22.1.1969</u> : Arrêt Rifadine	<u>19.10.1968</u> : Oncovin Caryolysine Natulan Cortancyl	<u>Décédé le</u> <u>18.3.1969</u>
	<u>3.2.1969</u> : Ictère disparu <u>4.2.1969</u> : Rifadine repri- se Ictère		

TABLEAU N° III

OBSERVATION N° III

L E C. René - 55 ans.

Chez un homme au sixième mois d'une maladie de Hodgkin cervico-axillaire avec paraplégie traitée par radiothérapie, tuberculose pulmonaire bilatérale avec BK. +, dont l'évolution fut contrôlée puis stabilisée par les tuberculostatiques. La cuti-réaction était positive. 1.000 lymphocytes par mm³. Une hypo-proteidémie terminale à 53 gr pour 1.000, avec 19 gr d'albumine fut enregistrée et le décès sembla hâté par une cirrhose associée. (voir tableau IV page suivante).


<u>HODGKIN</u>	<u>TUBERCULOSE</u>	<u>TRAITEMENT DU HODGKIN</u>	<u>HISTOLOGIE ET BIOLOGIE</u>
<u>1959 :</u> Adénopathies sus-claviculai- res droites et axillaire gau- che <u>26.2.1960 :</u> Biopsie + Paraplégie 	<u>28.2.1960 :</u> IP nodulaire bi- latérale BK. +  <u>30.3.1960 :</u> Nettoyage par- tiel <u>Décédé le</u> <u>28.6.1960</u> (cirrhose)	15 séances de Radiothérapie (200 KV) suspendues en raison de la leucopénie le 3.3.1960 Décadron	<u>Lymphocytes</u> (30.2.1960) 1000/mm3 <u>Cuti-réaction</u> + <u>Electrophorèse :</u> P = 53 g. °/°° Alb = 39 % Glob = α_1 = 6 % α_2 = 12 % β = 9 % γ = 34 %

TABLEAU N° IV

OBSERVATION N° IV

=====

T R A. Henri - 24 ans.

Au sixième mois d'une maladie de Hodgkin cervico-médiastinale gauche chez un homme de 24 ans, traitée par irradiation sus-diaphragmatique, tuberculose nodulaire lobaire supérieure gauche, bacillifère, dont le nettoyage définitif fut obtenu par l'association I.N.H., streptomycine et P.A.S. , 800 lymphocytes par mm³. Cuti-réaction négative.

Il s'agit d'une forme à cellularité mixte (classe III de LUKES).
(voir tableau V page suivante).

HODGKIN	TUBERCULOSE	TRAITEMENT DU HODGKIN	HISTOLOGIE ET BIOLOGIE
3.6.1958 Adénopathie cervico-médias- tinale gauche  Mars 1959 : Fièvre ondu- lante 23.1.1961 : Fièvre ondu- lante 12.2.1961 : Pneumopéritoi- ne ? Gastrosco- pie ? Mai 1961 : Rx gastrique 13.7.1961 : Gastrectomie (gastrite né- crosante)	 8.11.1958 : TP. nodulaire lobe supérieur gauche BK. + 30.5.1960 : Nettoyage sen- sible après : INH - PAS - SM Décédé le 5.9.1961.	Mai 1958 : Corticoides Juin 1958 : Cobalt = 4000 R cervico-sternal Novembre 1958 : Cobalt : 1500 R thoracique anté- rieur Janvier 1961 : Corticoides Janvier à Avril 1961 Cobalt 20.6.1961 : Cobalt épigas- trique	Cellularité mixte Lymphocytes : (2.9.1958) 850/mm³ Cuti-Réaction - Electrophorèse : P = 78 % Alb = 45 % Glob = α_1 = 7 % α_2 = 14 % β = 15 % γ = 19 %

TABLEAU N° V

OBSERVATION N° V

=====

D. E. S. Joseph - 40 ans.

Homme. Après trois mois de corticothérapie pour adénopathie sus-claviculaire droite accompagnée de splénomégalie, tuberculose pulmonaire ulcéro-nodulaire réduite en quelques mois par 1^{er} I.N.H., streptomycine et P.A.S. en dépit de lésions très excavées et très étendues.

Il s'agit d'une forme à cellularité mixte (classe III de LUKES), mais avec lymphopénie (900 lymphocytes par mm³).
Voir tableau VI page suivante).


<u>HODGKIN</u>	<u>TUBERCULOSE</u>	<u>TRAITEMENT DU HODGKIN</u>	<u>HISTOLOGIE ET BIOLOGIE</u>
<u>19.8.1966 :</u> Adénopathie cervicale droi- te Splénomégalie  <u>24.4.1970 :</u> Lymphographie ++	 <u>3.2.1967 :</u> TP. ulcéro-nodu- laire bi-apicale BK. + <u>5.6.1967 :</u> Nettoyage sensi- ble après : INH - Strepto - PAS. <u>10.II.1970 :</u> ITN.	<u>Sept. Oct. Nov.</u> <u>1966 :</u> Cortancyl : 30mg /jour <u>5.5. au</u> <u>5.6.1970 :</u> Cobalt : 4000 R sus-diaphragma- tique <u>I8.I au</u> <u>I4.2.1970 :</u> Cobalt : 4000 R sous-diaphrag- matique	<u>Cellularité mixte</u> <u>Lymphocytes</u> <u>(2I.4.1970)</u> 900/mm3 <u>Cuti-Réaction ?</u> <u>Electrophorèse :</u> P = 72 g. / ... Alb = 62 % Glob = α_1 = 2 % α_2 = 8 % β = 10 % γ = 18 %

TABLEAU N° VI

OBSERVATION N° VI

=====

H E R S. Raymond ~ 45 ans.

Chez un homme, découverte simultanée d'une maladie de Hodgkin sévère au stade IV, déplétion lymphocytaire (390 lymphocytes par mm³) et cuti-réaction négative, et d'une tuberculose pulmonaire lobaire supérieure droite largement excavée, avec BK. +. La tuberculose fut stabilisée par l'I.N.H., Streptomycine, P.A.S. et Ethambutol. Décès dans une cachexie avec syndrome de rabougrissement et présence d'Aspergillus fumigatus dans les selles et dans les urines, après un an de traitement par corticoïdes et chimiothérapie. (voir tableau VII page suivante).


<u>HODGKIN</u>	<u>TUBERCULOSE</u>	<u>TRAITEMENT DU HODGKIN</u>	<u>HISTOLOGIE ET BIOLOGIE</u>
Août 1969 : Fièvre ondu- lante Biopsie mé- diastinale + Lymphogra- phie +, 16.12.1969 : Laparoscopie + Hépto-spléno- mégalie Février 1970 : Reprise de la fièvre  26.6.1970 : Aspergillus fumigatus Cachexie	Août 1969 : TP excavée apica- le droite BK. +  Stabilisation après INH - SM - PAS puis Etham- butol Décédé en Juillet 1970	Août 1969 à Novembre 1970 : Velbé Rufochromomyci- ne Février à Mai 1970 : Cortancyl : 30 mg/jour Juin à Juillet 1970 : Velbé : 5 mg tous les 15 jours	Déplétion lympho- cytaire Lymphocytes : (21.II.1969) 390/mm3 Cuti-Réaction : négative (Août 1969) positive (Juin 1970) Electrophorèse : (22.I.1970) P = 69 g.°/oo Alb = 47 % Glob = α_1 = 5 % α_2 = 11 % β = 13 % γ = 24 %

Tableau N° VII

OBSERVATION N° VII

=====

K O C. Arlette - 31 ans.

Jeune femme effectuant un séjour de six mois en sanatorium pour tuberculose pulmonaire lobaire supérieure droite, avec expectoration bacillifère. Adénopathie sus-claviculaire droite fistulisée, avec BK. +. Nettoyage des lésions tuberculeuses cervicales et guérison par Streptomycine, P.A.S. et I.N.H. Lors de son retour de sanatorium : adénopathie sus-claviculaire gauche hodgkinienne confirmée par biopsie (classe III de LU/KES); cellularité mixte, 1.500 lymphocytes par mm³. Généralisation hodgkinienne au cours des années suivantes (stade IV). (voir tableau VIII page suivante).


<u>HODGKIN</u>	<u>TUBERCULOSE</u>	<u>TRAITEMENT DU HODGKIN</u>	<u>HISTOLOGIE ET BIOLOGIE</u>
2.10.1965 . Adénopathie cervicale gau- che vérifiée par Biopsie + 14.1.1966 . Adénopathie médiastinale droite 4.6.1966 . Prurit 27.6.1968 . Lymphographie + 10.5.1970 . Biopsie in- guinale + 	Février à Septembre 1965 . TP nodulaire 2.2.1965 : LSD = BK + 24.3.1965 . Adénopathie cervicale droi- te = BK. + Strepto - INH - PAS. 14.1.1966 . Nodule fibreux LSD Stabilisation acquise 	14.12.1965 au 14.1.1966 : Cobalt : 4000 R sus-diaphrag. 18.3 au 19.4.1966 . Cobalt : 4000 R sous-diaphrag. Août 1966 à Septembre 1967 . Velbé hebdoma- daire 23.4 au 26.5.1970 . Cobalt : 4000 R sous-diaphrag. 6.7.1970 . Velbé Rufochromomycine Thio-tépa	Cellularité mixte Lymphocytes (2.10.1965) 1500/mm3 Cuti-Réaction ? Electrophorèse (11.5.1970) P = 57 % Alb = 47 % Glob = α_1 = 5 % α_2 = 13 % β = 12 % γ = 13 %

TABLEAU N° VIII

OBSERVATION N° VIII

=====

B O U L. Lucienne - 58 ans.

Femme ayant présenté, neuf ans auparavant, une tuberculose pulmonaire lobaire supérieure droite. Tuméfaction sternale et sus-claviculaire dont la biopsie précise la nature hodgkinienne. Une bronchoscopie révèle la présence de BK., en l'absence de tout processus tuberculeux évolutif pulmonaire ou ganglionnaire. Traitement tuberculostatique de sécurité pendant six mois. La cuti reste positive. (voir tableau IX page suivante).


<u>HODGKIN</u>	<u>TUBERCULOSE</u>	<u>TRAITEMENT DU HODGKIN</u>	<u>HISTOLOGIE ET BIOLOGIE</u>
<u>Juillet 1964</u> : Compression mé- diastinale Tuméfaction sternale et sus-claviculai- re bilatérale <u>Octobre 1964</u> : Splénomégalie Lymphogra- phie = 0  <u>2.9.1965</u> : Décès (ictère hémolytique)	<u>1953</u> : TP. apicale droite <u>9.7.1964</u> : BK. + après bronchoscopie <u>3.9.1964</u> :  <u>14.II.1964 au 19.5.1965</u> : INH - PAS - SM Stabilisation	<u>14.II au 14.I2.1964</u> : Cobalt . 3250 R thoraci- que 2000 R spléni- que (répression sensible) puis : Natulan	<u>Variété non pré- cisée</u> <u>Lymphocytes</u> ? <u>Cuti-Réaction</u> + <u>Electrophorèse</u> (1.9.1964, P = 71 g. / Alb = 48 % Glob = α_1 = 5 % α_2 = 8 % β = 10 % γ = 29 %

TABLEAU N° IX

- TROISIEME PARTIE -

LA MALADIE DE HODGKIN FAVORISE LA TUBERCULOSE
MAIS AUSSI D'AUTRES INFECTIONS

=====

- I -

Eléments favorisant la tuberculose
au cours de la maladie de Hodgkin

-:-

Si donc la tuberculose n'est pas à l'origine de la maladie de Hodgkin, on est en droit de penser que la plus grande fréquence des bacilloses chez les hodgkiniens est due au terrain même de la lymphogranulomatose maligne ou aux thérapeutiques appliquées.

D'une manière schématique, on peut proposer trois explications : la maladie de Hodgkin diminue les défenses de l'organisme vis-à-vis du BK., la thérapeutique peut préparer le terrain à l'aggression tuberculeuse, enfin la maladie de Hodgkin peut réveiller une tuberculose ancienne guérie ou passée inaperçue.

Nous allons revoir chacun de ces points.

A - LA MALADIE DE HODGKIN DIMINUE LES DEFENSES DE L'ORGANISME VIS-A-VIS DE LA TUBERCULOSE.

Toute une série de faits très anciennement connus laissent supposer que les réactions immunologiques de l'organisme sont perturbées dans la maladie de Hodgkin. La NEGATIVITE DE LA CUTI-REACTION A LA TUBERCULINE en est la manifestation la plus classique. A vrai dire, si cette négativité est un signe habituel, elle n'est pas constante. ENNUYER, en 1957, étudie les réactions tuberculiniques chez 50 malades atteints de lymphogranulomatose maligne et retrouve 26 malades ayant eu au moins une fois un test tuberculinique positif au cours de l'évolution de la maladie de Hodgkin. Il en conclut que, bien que nettement inférieur à l'index tuberculinique de la population, le pourcentage des réactions positives est suffisamment élevé pour ne pas accorder de valeur diagnostique aux réactions à la tuberculine.

ASUMAN, en 1967, constate que chez 22 hodgkiniens le transfert de la sensibilité tuberculinique ne réussit qu'une fois. Quoi qu'il en soit, l'accent est mis sur une perturbation des défenses immunitaires dans la maladie de Hodgkin et avant de voir comment ceci peut expliquer la plus grande fréquence de la tuberculose, nous nous proposons de faire un bref tour d'horizon du statut immunologique du Hodgkin.

Schématiquement, deux types de défenses spécifiques peuvent être actuellement distingués dans l'organisme.

- Les défenses dites humorales, sous la dépendance d'anticorps circulants produits par les plasmocytes.
- Les défenses dites cellulaires, d'hypersensibilité retardée, dépendant des lymphocytes, sans manifestation humorale, sous le contrôle du thymus.

Ce schéma très simplifié peut nous permettre de décrire les désordres immunologiques observés dans la maladie de Hodgkin, désordres suffisants pour expliquer un grand nombre d'épisodes tuberculeux d'une part et les autres infections d'autre part.

1) Les perturbations des défenses cellulaires.

- a) La lymphopénie est d'autant plus marquée que la maladie est plus avancée. Sur 50 malades autopsiés, AISENBERG n'en retrouve que deux ayant présenté dans les six derniers mois une lymphocytose normale. C'est un signe peu fréquent au début de la maladie.

ROSENTHAL met l'accent sur le parallélisme entre les lymphocytoses sanguine et tissulaires. Dans le même ordre d'idée, la classification histologique de LUKES attache une grande importance à la lymphocytose ganglionnaire, témoin de la richesse lymphocytaire.

L'observation d'une anergie tuberculinique sans lymphopénie pose le problème de la valeur fonctionnelle de ces lymphocytes. C'est pourquoi il importe de préciser la

b) Qualité des lymphocytes.

La culture des lymphocytes isolés en présence de divers antigènes (notamment la phytohémagglutinine) permet d'observer la transformation blastique des lymphocytes sous l'influence de ces antigènes. Cette transformation est retardée ou diminuée avec les lymphocytes de malades atteints de maladie de Hodgkin.

La réaction de transfert des lymphocytes consiste à injecter dans la peau des lymphocytes isolés d'un donneur. Cette technique fournit une indication globale sur la réaction greffe contre hôte. Le transfert de lymphocytes de sujets hodgkiniens à des sujets normaux permet d'observer la conservation de la réaction précoce, mais la diminution ou la disparition de la réaction du 7ème jour. A l'inverse les homogreffes sont tolérées plus longtemps par le hodgkinien que par le sujet normal.

CROWTER en 1969, révèle les modifications des lymphocytes circulants au cours de la maladie de Hodgkin : présence de grands lymphocytes synthétisant l'ADN, de moyens lymphocytes basophiles et de cellules occasionnelles du plasma.

c) Les réactions d'hypersensibilité retardée permettent de même d'apprécier le déficit lymphocytaire.

Nous avons déjà signalé la perte d'une sensibilité préexistante à la tuberculine. Mais cette anergie cutanée s'avère également remarquable pour d'autres antigènes tels que l'antigène ourlien ou l'antigène de *Candida Albicans*.

L'étude d'une sensibilité acquise a l'avantage de ne pas tenir compte d'une négativité, possible au départ, des différents tests. L'étude de l'allergie cutanée par dinitrochlorobenzène (D.N.C.B.), allergène de contact à réponse constante, a montré à AISENBERG que les malades en poussée évolutive sont constamment incapables de se sensibiliser, alors que cela redevient possible en période de rémission.

Le transfert passif de l'immunité consiste à transférer chez un hodgkinien des lymphocytes de donneurs hypersensibles à la tuberculine puis à pratiquer un test tuberculinique. La réaction, toujours positive chez des sujets normaux, est négative chez les hodgkiniens.

Enfin, le B.C.G. test, exploration facile à réaliser, montre la carence immunitaire et est de plus un argument de poids pour estimer le pronostic. Fait par scarification avec lecture de la 36ème à la 48ème heure, il n'est positif que dans 40 % des cas d'après une étude de SCHNEIDER, alors que 93 % des témoins sont allergiques. Pour SOKAL, sa négativité est un argument en faveur d'un sombre pronostic. Sur 8 malades dont les tests cutanés au P.P.D. étaient négatifs, 7 sont décédés au cours de l'année suivante. Sur 24 malades dont le test était positif, un seul est décédé au cours de l'année.

2) Les perturbations des défenses humorales.

Le taux des anticorps est longtemps normal ou légèrement augmenté, parfois un peu abaissé lors des phases évolutives et franchement effondré à la période terminale. Les Ig. M. sont abaissées plus précocement que les autres immunoglobulines. Il est probable cependant

L'étude d'une sensibilité acquise a l'avantage de ne pas tenir compte d'une négativité, possible au départ, des différents tests. L'étude de l'allergie cutanée par dinitrochlorobenzène (D.N.C.B.), allergène de contact à réponse constante, a montré à AISENBERG que les malades en poussée évolutive sont constamment incapables de se sensibiliser, alors que cela redevient possible en période de rémission.

Le transfert passif de l'immunité consiste à transférer chez un hodgkinien des lymphocytes de donneurs hypersensibles à la tuberculine puis à pratiquer un test tuberculinique. La réaction, toujours positive chez des sujets normaux, est négative chez les hodgkiniens.

Enfin, le B.C.G. test, exploration facile à réaliser, montre la carence immunitaire et est de plus un argument de poids pour estimer le pronostic. Fait par scarification avec lecture de la 36ème à la 48ème heure, il n'est positif que dans 40 % des cas d'après une étude de SCHNEIDER, alors que 93 % des témoins sont allergiques. Pour SOKAL, sa négativité est un argument en faveur d'un sombre pronostic. Sur 8 malades dont les tests cutanés au P.P.D. étaient négatifs, 7 sont décédés au cours de l'année suivante. Sur 24 malades dont le test était positif, un seul est décédé au cours de l'année.

2) Les perturbations des défenses humorales.

Le taux des anticorps est longtemps normal ou légèrement augmenté, parfois un peu abaissé lors des phases évolutives et franchement effondré à la période terminale. Les Ig. M. sont abaissées plus précocement que les autres immunoglobulines. Il est probable cependant

que les anticorps formés ne sont pas toujours normaux comme le prouve la sensibilité des malades à certains germes et la survenue, à vrai dire exceptionnelle, de maladies à auto-anticorps.

3) Evolution chronologique des perturbations.

Au tout début de la maladie de Hodgkin, il n'existe aucune modification des défenses et toutes les recherches ou tests immunologiques pratiqués sont normaux dans des cas de lymphogranulomatose maligne diagnostiquée à un stade I, avant tout traitement.

Puis apparaissent les troubles de l'hypersensibilité retardée, révélés par le rejet des homogreffes coïncidant d'abord avec une lymphocytose encore normale. Il y a seulement trouble fonctionnel des lymphocytes.

Ultérieurement la lymphopénie apparaît et s'exagère tandis que les tests de transformation lymphoblastique in vitro montrent l'accentuation du trouble fonctionnel.

La prolongation au-delà de deux ans d'une rémission complète induite par le traitement permet à ces perturbations de régresser et à toutes les explorations immunitaires de se normaliser, qu'il s'agisse en particulier des tests cutanés à la tuberculine ou de la sensibilisation au D.N.C.B.

Si l'affection continue à évoluer ou si le diagnostic est fait à un stade plus avancé, on enregistre la poursuite de l'altération quantitative et qualitative des lymphocytes et il semble apparaître en outre un trouble de la synthèse des anticorps dont le taux est encore normal.

Enfin, au stade terminal de la maladie, existe une diminution des immunoglobines et, à cette phase, l'altération

tération globale des défenses immunitaires, non caractéristique de la lymphogranulomatose maligne, est celle qui s'observe à la fin de toutes les affections gravement débilitantes, en particulier de tous les cancers.

Par ailleurs, il faut noter que ces troubles immunitaires peuvent être aggravés, au moins temporairement, par les traitements administrés contre la lymphogranulomatose maligne, comme nous allons le voir, qu'il s'agisse de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie.

Enfin, notons un syndrome particulier dit syndrome de dépression immunitaire ou syndrome de rabougrissement, que nous avons observé dans une de nos observations (observation N° VI). Les malades ayant un effondrement de leurs tests d'immunité cellulaire ont cet aspect clinique caractéristique, évoquant celui obtenu expérimentalement chez la souris par la thymectomie néonatale : perte de poids, troubles digestifs, modifications cutanées, phanériennes (peau sèche, perte de poils), infections répétées. Un tel aspect clinique de grande dépression immunitaire peut s'observer dans les circonstances qui altèrent l'immunité au cours du Hodgkin : suites de cobaltothérapie étendue, traitement corticoïde longtemps poursuivi et surtout forme viscérale généralisée de la maladie.

- 4) Il n'est pas dans notre propos enfin d'entrer dans les discussions portant sur les relations entre la carence immunitaire et la maladie de Hodgkin. Ce déficit est-il la cause du sarcome réticulaire ou inversement la maladie de Hodgkin est-elle la cause du déficit immunitaire ? Notons simplement qu'un malade atteint de lymphogranulomatose maligne présente un terrain faiblement défendu vis-à-vis des agressions microbiennes et notamment de la tuberculose.

EXPLORATION DU DEFICIT IMMUNITAIRE
DANS LA MALADIE DE HODGKIN

=====

<u>DEFENSES CELLULAIRES</u>	<u>DEFENSES HUMORALES</u>
<u>Appréciation quantitative :</u> - taux des lymphocytes sanguins - lymphocytose ganglionnaire (classification de LUKES) <u>Appréciation qualitative :</u> - cuti-réaction tuberculine - test de transformation lymphoblastique (T.T.L.) - réaction de transfert des lymphocytes - test au D.N.C.B. - B.C.G. test	- électrophorèse des protéines sanguines - Immunoélectrophorèse

TABLEAU X

5) La carence immunitaire suffit à expliquer un grand nombre d'épisodes tuberculeux.

Le déficit très tardif en immunoglobulines à la phase terminale de la maladie (retrouvé dans nos observations I et III) n'est ordinairement pas en cause. Le développement de l'infection tuberculeuse est en effet peu sensible aux variations de l'immunité humorale. Le déficit en immunoglobulines est le plus souvent compatible avec une évolution favorable du processus tuberculeux. Le témoignage nous en est fourni par les cas de tuberculose observés chez les hypogammaglobulinémiques.

En revanche, la tuberculose prend une allure sévère et souvent gravissime sur les terrains frappés par une carence de l'immunité cellulaire de type retardé. Les lymphopéniques appartiennent à ce groupe où se recrutent les carences immunitaires congénitales de type mixte exposant aux accidents mortels de la vaccination par le BCG.

Or, les hodgkiniens sont électivement frappés par un déficit de l'immunité cellulaire. Il existe cependant de curieuses discordances, à ce jour inexpliquées, dans la carence de l'immunité retardée. Ainsi, la lymphopénie de certains malades (observation N° III) alors que leur cuti reste positive, et aussi le cas de l'observation N° VI, avec déplétion lymphocytaire, où la cuti initialement négative, se positive à la phase terminale.

B - LA THERAPEUTIQUE DU HODGKIN PEUT PREPARER LE TERRAIN A UNE INFECTION TUBERCULEUSE.

Il est indéniable qu'un certain nombre de facteurs iatrogènes favorisent l'infection tuberculeuse chez les hodgkiniens. Nous allons les voir un à un.

- 1) La radiothérapie a pu être incriminée à l'origine d'un réveil évolutif tuberculeux, par effet direct de l'irradiation sur un foyer ancien et/ou méconnu; ou parfois, au bout d'un long délai, au sein d'un poumon radiothérapique comme le révèle une observation de CROIZAT chez une femme présentant une évolution tuberculeuse quinze ans après irradiation pour maladie de Hodgkin. CROIZAT remarque que la radiothérapie a eu dans l'évolution de cette tuberculose un rôle probablement focalisateur.

Enfin la radiothérapie a un effet immuno-dépresseur dont le stigmate courant est la lymphopénie et cet effet semble pouvoir être évoqué ou du moins discuté dans nos observations N° I, III et IV.

- 2) L'hormonothérapie par les dérivés corticoïdes a les effets immunodépresseurs les plus nets et ce d'autant plus que la corticothérapie est plus continue et plus prolongée. C'est en 1954 que MILLIEZ a dénoncé cet effet néfaste à propos d'une méningite tuberculeuse foudroyante chez une jeune fille de 15 ans présentant une maladie de Hodgkin, ayant subi une radiothérapie massive et en cours de traitement par la cortisone. La même année, MARCHAL présentait 4 cas de tuberculose associée à la lymphogranulomatose maligne après traitement par l'A.C.T.H. et la cortisone.

La dépression des défenses de l'organisme, en particulier de leur composante cellulaire par la corticothérapie a été, depuis, évoquée en maintes circonstances. Aussi, comme le rappelle HOERNI, les infections, et notamment la tuberculose, étant favorisées par le déficit immunitaire spontané lié à la maladie, il paraît essentiel de ne pas l'aggraver par le traitement. Ainsi, "l'utilisation de la corticothérapie doit être actuellement prohibée

d'une façon générale dans le traitement de la maladie de Hodgkin. Seules sont autorisées, en association à une polychimiothérapie, des cures, éventuellement à fortes doses, mais courtes, de huit à dix jours, qui n'ont aucun effet immunodépresseur décelable".

La corticothérapie peut être en cause dans notre observation N° IV.

- 3) La chimiothérapie antimitotique déprime également les réactions immunitaires et il est intéressant de constater que ce même traitement administré de façon prolongée, à visée immunosuppressive pour diverses affections auto-immunes ou chez des sujets greffés, s'accompagne fréquemment d'infections du même type que celles rencontrées dans la maladie de Hodgkin. La fréquence de ces infections fongiques et cytomégaliqes en particulier augmente d'ailleurs avec la durée du traitement. Car, comme l'a montré AMIEL, pour une même dose totale, les agents anti-cancéreux sont moins immunodépresseurs quand ils sont administrés à fortes doses mais en cures brèves et discontinues, plutôt qu'en cures continues.

SCHNEIDER note le même effet immunodépresseur des chimiothérapies continues en étudiant les réactions de l'hypersensibilité retardée au B.C.G. sous l'influence de diverses modalités d'administration des anticancéreux.

L'effet favorisant de la chimiothérapie a pu être imputé dans notre observation N° VI.

C - UNE MALADIE DE HODGKIN PEUT REVEILLER UNE TUBERCULOSE ANCIENNE GUERIE OU PASSEE INAPERCUE.

Un foyer tuberculeux pré-existant est parfois à l'origine d'un processus évolutif qui accompagne l'éclosion

de la maladie de Hodgkin, comme le révèle notre observation N° VIII, ou demeure une constatation isolée sans qu'un processus évolutif lui fasse suite.

Ce fait a été enregistré dans deux observations de la thèse de RAVAULT, donnant l'explication d'émissions bacillaires sans lendemain au cours d'un processus ganglionnaire authentiquement hodgkinien, responsable de l'effraction d'un foyer ancien.

La prudence impose cependant, en tel cas, une antibiothérapie de sécurité à maintenir au moins six mois devant un risque phtisogène certainement accru sur ce terrain de carence de l'immunité cellulaire.

Il n'est d'ailleurs pas toujours possible de dire si c'est la maladie de Hodgkin elle-même qui a réveillé une tuberculose, par action "mécanique" par exemple ou par dépression de l'immunité, ou si c'est la thérapeutique, corticoïde en particulier qui doit être mise en cause.

- 4 -

- II -

Place de la Tuberculose
parmi les accidents infectieux
au cours de la Maladie de Hodgkin

- 1 -

Nous avons vu que les sujets atteints de maladie de Hodgkin sont particulièrement sensibles aux infections, et parmi celles-ci à la tuberculose. Encore faut-il constater la raréfaction en général de la tuberculose, autrefois considérée comme une complication élective de la maladie de Hodgkin.

Si tous les types d'infections peuvent être rencontrés, il faut remarquer la fréquence des viroses, en particulier de celles dues à un herpès virus et, plus généralement la prédominance des infections dues à des germes contre lesquels interviennent, de façon prépondérante, les réactions de défense de type cellulaire (viroses, mycoses, parasitoses).

La fréquence des complications infectieuses au cours de l'évolution d'une maladie de Hodgkin paraît élevée, mais elle est difficile à évaluer exactement. Une statistique ne concernant que le zona et portant sur plus de 55.000 malades hospitalisés a permis à WRIGHT de préciser que la fréquence de cette virose est de 9 % chez les hodgkiniens contre 0,22 % chez les malades non-cancéreux.

Nous avons vu les causes favorisantes des infections, en relation avec les troubles immunitaires caractérisant la maladie de Hodgkin. L'altération précoce et élective des défenses cellulaires entraîne une sensibilité aux infections virales. Les parasitoses pourraient également être favorisées à cette phase. Ultérieurement, la diminution des défenses cellulaires s'accroît et une altération des défenses humorales apparaît pour aboutir, au stade terminal, à une défaillance immunitaire globale et profonde. Simultanément les risques de complications bactériennes et mycosiques augmentent et les infections virales revêtent alors un caractère de gravité (zonas nécrotiques ou généralisés).

Dans nos observations personnelles, nous nous sommes limités à comparer la fréquence de la tuberculose à celle, toute particulière, des mycoses, de la varicelle et du zona (voir tableau XI, page 49). Sur 142 hodgkiniens, nous avons relevé 8 tuberculoses, 5 candidoses, 11 zonas et 1 varicelle. Dans le cas de varicelle observé, une localisation pulmonaire micronodulaire apparut de façon fugace, son effacement spontané s'effectuant en quelques jours, à mesure que l'éruption regressait.

Nous présentons en outre deux tableaux réalisés par HOERNI (tableaux XII et XIII, pages 50 et 51) montrant, d'une part la répartition des 129 infections en fonction du germe et de la localisation, d'autre part la date de survenue des infections au cours de l'évolution de la maladie de Hodgkin.

- : - - - -

PLACE DE LA TUBERCULOSE
DANS LA PATHOLOGIE INFECTIEUSE
AU COURS DE LA MALADIE DE HODGKIN

=====

	<u>MALADIE</u> de <u>HODGKIN</u>	<u>ZONA</u>	<u>VARICELLE</u>	<u>MYCOSE</u>	<u>TUBERCULOSE</u>
HOERNI Bordeaux 1960 à 1969	140	21	3	8	1
CASAZZA U.S.A. 1953 à 1964	51 autopsiées	11	1	-	1
LEMENAGER Caen 1958 à 1970	142	11	1	5	8

TABLERAU XI

REPARTITION DES 129 INFECTIONS
EN FONCTION DU GERME ET DE LA LOCALISATION

<u>TYPES D'INFECTION</u>		<u>NOMBRE</u>	<u>TOTAL</u>
<u>BACTERIENNES</u>	respiratoires hautes	8	54
	respirat. broncho-pulmonaires	11	
	tuberculose	1	
	cutanées	16	
	septicémiques	6	
	muqueuses	2	
	dentaires	4	
	urinaires	2	
	coqueluches	2	
	appendicite gangréneuse	1	
	syphilis	1	
<u>VIRALES</u>	zonas	21	53
	varicelles	3	
	herpès	3	
	grippes	10	
	hépatites	7	
	pharyngites	2	
	pleurésie	1	
	péricardite	1	
	mononucléose infectieuse	2	
	rougeole	1	
	rubéole	1	
	oreillons	1	
<u>MYCOSIQUES</u>	candidoses muqueuses	4	8
	" rénale	1	
	" vaginale	1	
	pityriasis versicolor	1	
	trichophytose cutanée	1	
<u>PARASITAIRES</u>	toxoplasmoses	7	8
	filariose	1	
<u>Non déterminées</u>			6

TABLEAU XII
(d'après HOERNI)

DATE DE SURVENUE DES INFECTIONS

	Avant le Diagnostic (3 mois)	En même temps que le Diagnostic	En phase Evolutive	En phase de Rémission	Au stade terminal (dernier mois)
<u>BACTERIENNES</u>	3	1	23	18	3
<u>VIRALES</u>	5	-	13	29	6
<u>MYCOSIQUES</u>	-	-	1	2	-
<u>PARASITAIRES</u>	-	2	4	2	-
<u>NON DETERMINEES</u>	1	-	2	3	-
	7 %	2 %	33 %	42 %	16 %

TABLEAU XIII
(d'après HOERNI)

C O N C L U S I O N

=====

Ainsi donc, en nous appuyant sur 142 dossiers de Hodgkiniens recueillis au C.A.C. et au C.H.R. de CAEN, avons-nous voulu faire le point sur les relations actuelles entre la Tuberculose et la Maladie de Hodgkin.

Nous avons d'abord affirmé que la Tuberculose et la Maladie de Hodgkin sont deux affections différentes, mais que la Bacillose est plus fréquente chez le Hodgkinien que dans une population témoin. A ce propos nous avons fait état des difficultés rencontrées pour apprécier la morbidité tuberculeuse d'un secteur. Nous avons insisté sur l'impossibilité de comparer les taux enregistrés dans des pays et des régions différents, et bien sûr, pendant des périodes différentes. Deux chiffres nous ont paru significatifs : LEMENAGER, en 1970, trouve 5,6 % de morbidité tuberculeuse dans le Hodgkin, alors qu'HOERNI en trouve seulement 0,7 % en 1971. Nous ne possédons malheureusement pas le taux de morbidité tuberculeuse enregistrée dans une population témoin dans ces deux études.

Puis nous avons étudié les éléments favorisant la Tuberculose au cours de la Maladie de Hodgkin. D'une part, celle-ci diminue les défenses de l'organisme vis-à-vis de la Tuberculose, mais aussi d'autres infections, surtout virales, parasitaires et mycosiques. La Maladie de Hodgkin peut aussi réveiller une Tuberculose ancienne. Surtout, le traitement de la Maladie de Hodgkin peut favoriser une infection tuberculeuse.

Quelles seront les modalités pratiques à appliquer pour essayer de contrer ces infections bacillaires ?

- L'utilisation de la Corticothérapie n'est pas sans danger dans la Maladie de Hodgkin. On autorise, en association à une polychimiothérapie, des cures, éventuellement à fortes doses, mais courtes.
- En ce qui concerne la Chimiothérapie, AMIEL et Coll. et MATHE et Coll. préfèrent administrer de fortes doses en cures brèves et discontinues, plutôt qu'en cures continues.
- En cas d'infection tuberculeuse, les tuberculostatiques se sont montrés souvent actifs. Chez 6 de nos 8 malades, la Tuberculose a été enrayée par le traitement alors que l'hémodopathie poursuivait sa progression. Les nouvelles médications, associant à l'I.N.H. l'Ethambutol et la Rifampicine, se prêtent bien à cette vigoureuse action.
- Enfin, avant même l'extériorisation de tout processus tuberculeux actif, l'éventualité du réveil d'un foyer tuberculeux latent par les agents physiques, la corticothérapie, la chimiothérapie, pourrait être prévenue par la mise en oeuvre d'un traitement tuberculostatique de sécurité.

- - - - -

B I B L I O G R A P H I E

.....

- 1 - AISENBERG A.C.
Studies on delayed hypersensitivity in Hodgkin's disease.
J. CLIN. INVEST. - 1962, 41, 1964.
- 2 - AISENBERG A.C. and LESKOWITZ S.
Antibody formation in Hodgkin's disease.
NEW. ENG. J. MED. - 1963, 268, 1269.
- 3 - AISENBERG A.C.
Hodgkin's disease. Prognosis, treatment, and etiologic and immunologic considerations.
NEW. ENG. J. MED. - 1964, 270, 508, 565, 617.
- 4 - AISENBERG A.C.
Studies of lymphocyte transfer reactions in Hodgkin's disease.
J. CLIN. INVEST. - 1965, 44, 555.
- 5 - AISENBERG A.C.
Manifestations of immunologic unresponsiveness in Hodgkin's disease.
CANCER RES. - 1966, 26, 1152.
- 6 - AISENBERG A.C.
Immunologic status of Hodgkin's disease.
CANCER - 1966, 19, 385.
- 7 - AMIEL J.L., SEKIGUCHI M., DAGUET G., GARATTINI S. et PALMA V.
Etude de l'effet immunodépresseur des composés chimiques utilisés en chimiothérapie cancéreuse.
EUROP. J. CANCER - 1967, 3, 47.
- 8 - ARDEN M.J. and ROTTINO A.
Hodgkin's disease complicated by tuberculosis.
AM. REV. RESP. DIS. - 1966, 93, 811-815.

- 9 - BARMES A., HOROVITZ E. et SOULIER J.
Sur un cas de lymphogranulomatose maligne et de tuberculose associée.
MONTPELLIER MED. - 1954, 45, 340.
- 10 - BARAM P. and MOSKO M.M.
Adryalisable fraction from tuberculin sensitive human white blood cells capable of inducing tuberculin-delayed hypersensitivity in negative recipients.
IMMUNOLOGY - 1965, 8, 461.
- 11 - BARR M. and FAIRLEY G.H.
Circulating antibodies in the reticuloses.
LAURET - 1961, I, 1305.
- 12 - BERNADOU A., ZITTOUN R., BLANC C.M., SMADJA R. et BOUSSER J.
Epreuves d'hypersensibilité retardée au cours de la maladie de Hodgkin.
ANN. MED. INTERNE - 1970, 121, 301-311.
- 13 - BRANCH A.
Avian tubercule bacillus infection with special references to mammals and man; its reported association with Hodgkin's diseases.
AMER. J. PATH. - 1931, 12, 253.
- 14 - BRAUN H.
Lymphogranulomatose und Tuberkulose.
TUBERK. ARTZ. - 1960, 60, 556.
- 15 - BROWN R.S., HAYNES H.A., FOLEY H.T., GODWIN H.A., BERARD C.W. and CARBONE P.P.
Hodgkin's disease. Immunologic, clinical and histologic features of 50 untreated patients.
ANN. INTERN. MED. - 1967, 67, 291.

I6 - BULYCHEVA G.F.

The combination of Hodgkin's disease and tuberculosis in children.

VOPROSY GEMATOLOGII V PEDIATRII - 1964, 3, 410.

I7 - CASAZZA A.R., DUVALL C.P. and CARBONE P.P.

Summary of infectious complications occurring in patients with Hodgkin's diseases.

CANCER RES. - 1966, 26, 1290-1296.

I8 - CHASE M.W.

Delayed-type hypersensitivity and the immunology of Hodgkin's disease, with a parallel examination of sarcoidosis.

CANCER RES. - 1966, 26, 1097-1120.

I9 - CHAUVERGNE J. et HOERNI B.

Les complications infectieuses de la maladie de Hodgkin.

FRANCE MED. - 1968, 6, 277-284.

20 - CHEVALLIER P. et BERNARD J.

La maladie de Hodgkin.

I VOL. PARIS - 1932, MASSON ED.

21 - CROIZAT P., PAPILLON J., REVOL L., CHASSARD J.L. et PELLET M.

Tuberculose et Maladie de Hodgkin.

J. RADIOL. ELECTROL. - 1962, 43, 232-235.

22 - CROWTHER D., HAMILTON FAIRLEY G., SEWELL R.L.

Significance of the changes in the circulating lymphoid cells in Hodgkin's disease.

BRIT. MED. J. - 1969, 2, 473-477.

23 - DAGNELIE J. et POTVLIEGE P.

Lymphogranulomatose maligne de Hodgkin associée à deux types différents de lésions tuberculeuses.

ACTA CLIN. BELG. - 1951, 6, 257-267.

- 24 - DEBRAY J., KRULIK M., GIORGI H., BONNOT DU RUISSELET R.
Les lésions pulmonaires au cours de la maladie de Hodgkin.
ANN. MED. INT. - 1970, 121, 285-299.
- 25 - DUBIN I.N.
Poverty of immunological mechanism in patients with Hodgkin's disease.
ANN. INTERN. MED. - 1947, 27, 898.
- 26 - DUHAMEL G.
Evolution des idées sur la maladie de Hodgkin.
CANCER MED. - 1970, 92, 4736.
- 27 - ENNUYER A. et BACQ J.
Les réactions tuberculiques de cinquante malades atteints de lymphogranulomatose maligne.
SEM. HOP. PARIS - 1957, 16, 1022-1026.
- 28 - FUA C., BONAN R., RECANATINI R.
Tisi galoppante in un caso di morbo di Hodgkin trattato con prednisone.
MINERVA MED. - 1959, 50, 589-596.
- 29 - HILL R.B., ROWLANDS D.T. and RIFKIND D.
Infectious pulmonary disease in patients receiving immuno-suppressive therapy for organ transplantations.
NEW. ENG. J. MED. - 1964, 271, 1020.
- 30 - HOERNI B. et CHAUVERGNE J.
Aspects immunologiques de la maladie de Hodgkin. Revue générale.
FRANCE MED. - 1969, 10, 449-459.
- 31 - HOERNI B., CHAUVERGNE J. et PARSI M.
La fièvre de la maladie de Hodgkin. Hypothèse pathogénique.
PRES. MED. - 1970, 78, 1317-1319.

- 32 - HOERNI B., AUBERTIN J., SIMON G. et CHAUVERGNE G.
Les complications infectieuses de la maladie de Hodgkin.
ANN. MED. INTERNE - 1971, 122, 21-28.
- 33 - HOFFMAN G.T. and ROTTINO A.
Studies of immunologic reactions of patients with Hodgkin's
disease : antibody reactions to typhoid immunisation.
ARCH. INTERN. MED. - 1950, 86, 872.
- 34 - HORTON E.H.
Hodgkin's disease and caseous tuberculosis.
BRIT. J. TUBERC. - 1956, 50, 365-367.
- 35 - HOSTER A.A., DOAN C.A. and SCHUMACHER M.
Studies in Hodgkin's syndrome : relationship of tubercle bacilli to Hodgkin's syndrome.
J. LAB. CLIN. MED. - 1945, 30, 675.
- 36 - HOSTER H.A., DRATMAN M.B., CRAVER L.F. and ROCNICK H.A.
Hodgkin's disease 1832-1947.
CANCER RES. - 1948, 8, 1.
- 37 - ISRAEL L., MANNONI P., DELOBEL J., MAWAS C., GROSS B.,
GINESTE J. et SORS CH.
Note sur les résultats des intradermo-réactions de lymphocytes viables homologues et hétérologues chez des receveurs cancéreux et des témoins.
PATH. BIOL. - 1967, 15, 593-595.
- 38 - ISRAEL L., MAWAS C., BOUVRAIN A., MANNONI P. et SORS CH.
Etude de l'hypersensibilité retardée à la tuberculine chez 130 cancéreux adultes. Effets du B.C.G.
PATH. BIOL. - 1967, 15, 597-601.

- 39 - ISRAEL L., MANNONI P., MAWAS C., GINESTE J., GROSS B. et SORS CH.
70 perfusions de lymphocytes homologues dans 25 cas de cancers avancés.
PATH. BIOL. - 1967, 15, 603-606.
- 40 - JACKSON H.J. and PARKER F.J.
Hodgkin's disease; General considerations.
NEW. ENG. J. MED. - 1944, 230, I.
- 41 - JACKSON H.J.
Hodgkin's disease; Symptoms and course.
NEW. ENG. J. MED. - 1944, 231, 639.
- 42 - KOHOUT J.
Gemeinsames Vorkommen von Tuberkulose und malignen Lymphomen.
PRAXIS PNEUMOL. - 1970, 24, 280-286.
- 43 - LAMB D., PILNEY F., KELLY W.D. and GOOD R.A.
A comparative study of the incidence of anergy in patients with carcinoma, leukemia, Hodgkin's disease and other lymphomas.
J. IMMUNOL. - 1962, 89, 550.
- 44 - LAUBRY CH. et MARCHAL G.
Maladie de Hodgkin et tuberculose.
PRES. MED. - 1932, 40, 1397-1400.
- 45 - LEMENAGER J., CATTAN D., NEEL J.P., RUSSO F., WAUTIER J.L. et TANGUY A.
Tuberculose et carences immunitaires.
SEM. HOP. - 1970, 46, 1875-1882.
- 46 - LEMENAGER J., CATTAN D., MOREL C., NEEL J.P. et BENARD Y.
Tuberculose pulmonaire chez un hypo-gammaglobulinémique.
REV. TUBERC. PNEUMOL. - 1970, 34, 247.

- 47 - LEMENAGER J., BENARD Y., TANGUY A. et CARLES L.
Tuberculose et Maladie de Hodgkin.
REV. TUBERC. ET PNEUM. - 1971, 35, 299-312.
- 48 - LEMON W.S.
Tuberculosis as an etiological factor in Hodgkin's disease.
A historical review.
AMER. J. MED. SCI. - 1924, 127, 178.
- 49 - LEVIN A.G., CUSTODIO D.B., MANDEL E.E. and SOUTHAM C.M.
Rejection of cancer hemotransplants by patients with debilitating non neoplastic diseases.
ANN. N-Y. ACAD. SC. - 1964, 120, 410.
- 50 - LEVI-VALENSI A., AKOUN G., SARFATI R., COHEN ADAD F.,
LORENTE P.
Maladie de Hodgkin associée à une tuberculose panglionnaire
et compliquée de torulose à forme méningée.
ARCH. FRANC. PED. - 1954, 14, 225-233.
- 51 - LUKES R.J.
A review of the american concept of malignant lymphoma.
The evolution of a modern classification.
IN PROGRESS IN LYMPHOLOGY ED. PAR RUTTIMAN A., I VOL.,
STUTTGART 1967, P.109.
- 52 - MAC MAHON H.E. and PARKER F.J.
Case of lymphoblastoma, Hodgkin's disease and tuberculosis.
AMER. J. PATH. - 1930, 6, 367.
- 53 - MARCHAL G., DUHAMEL G., WEILL-FAGE J.C. et BLAMOUTIER
Maladie de Hodgkin avec tableau initial de leucémie lymphoïde et association de tuberculose.
SEC. MED. HOP. PARIS - 1953, 69, 734-738.

- 54 - MARCHAL G., DUHAMEL G., WEILL-FAGE J.C. et MAZELTON
Nouveaux cas d'association de maladie de Hodgkin et de tuberculose.
LE SANG - 1954, 25, 71-77.
- 55 - MARCHAL G. et DUHAMEL G.
Tuberculose terminale dans les hémopathies traitées par A.C.T.H. et cortisone.
BULL. et MEM. SOC. MED. HOP. PARIS - 1954, 70, 991.
- 56 - MAZARE Y., MICOUD M. et MASSOT
Association de leucémie lymphoïde, de maladie de Hodgkin et de tuberculose.
LYON MED. - 1969, 221, 341-346.
- 57 - MILLIEZ P., DREYFUS B., HIMBERT J. et MOREAU PH.
Maladie de Hodgkin. Radiothérapie massive. Méningite tuberculeuse foudroyante au cours d'un traitement par la cortisone.
BULL. SOC. MED. HOP. PARIS - 1954, 70, 943-950.
- 58 - MOULIAS R. et MULLER-BERAT C.N.
Immunogénétique et susceptibilité à l'infection. Nouveaux aperçus sur la notion de "terrain" en pathologie infectieuse.
PRES. MED. - 1970, 78, 225-228.
- 59 - MUFTUOGLU A.U. and BALKUV S.
Passive transfer of tuberculin sensitivity to patients with Hodgkin's disease.
NEW. ENG. J. MED. - 1967, 277, 126-129.
- 60 - NOROX P.
Contribution à l'étude et à la discussion des rapports entre maladie de Hodgkin et tuberculose.
Thèse MEDECINE - PARIS - 1951.

- 61 - PARK R.K., GOLTZ R.W. and CAREY T.B.
Unusual cutaneous infections associated with immuno-suppressive therapy.
ARCH. DERM. - 1967, 95, 345.
- 62 - PARKER F.J., JACKSON H.J., BETHEA J.M. and OTIS F.
The coexistence of tuberculosis with Hodgkin's disease and other forms of malignant lymphoma.
AMER. J. MED. SCI. - 1932, 184, 694.
- 63 - PARKER F.J., JACKSON H.J., FITZ HUGH G. and SPIES T.D.
Studies of diseases of the lymphoid and the myeloid tissues.
IV. skin reaction to human and avian tuberculin.
J. IMMUNOL. - 1932, 22, 277.
- 64 - RAVAUULT J.
A propos de deux cas de maladie de Hodgkin. Constatation de la présence de BK. au cours de l'évolution.
THESE - PARIS - 1962.
- 65 - ROSENTHAL S.R.
Significance of tissue lymphocytes in the prognosis of lymphogranulomatosis.
ARCH. PATH. - 1936, 21, 628.
- 66 - SARIC, TESSIER, CASTANET et ARNE
Méningite tuberculeuse terminale d'une maladie de Hodgkin traitée par la cortisone.
J. MED. BORDEAUX - 1957, 134, 487-488.
- 67 - SCHIER W.W., ROTH A., OSTROFF G. and SCHRIFT M.
Hodgkin's disease and immunity.
AMER. J. MED. - 1956, 20, 94.

- 68 - SCHNEIDER M.
Effet des chimiothérapies cytostatiques sur une réaction
d'hypersensibilité retardée.
REV. FRANC. ETUDES CLIN. ET BIOL. - 1968, 13, 877-880.
- 69 - SCHNEIDER M., SCHWARZENBERG L., AMIEL J.L., HAYAT M.,
MASCARO G., OTMEZGUINE Y. et MATHE G.
Les réponses immunitaires au cours de la maladie de Hodgkin.
PRES. MED. - 1970, 78, 1769-1774.
- 70 - SIMON G.
Complications infectieuses des réticulopathies malignes.
THESE - BORDEAUX - 1969.
- 71 - SOKAL J.E. and PRIMIKIRIOS N.
The delayed skin test in Hodgkin's disease and lymphosarcoma :
effects of disease activity.
CANCER - 1961, 14, 597.
- 72 - SOKAL J.E.
Discussion on : manifestations of immunologic unresponsiveness
in Hodgkin's disease.
CANCER RES. - 1966, 26, 1161.
- 73 - SOKAL J.E. and AUNGST C.W.
Response to B.C.G. vaccination and survival in advanced
Hodgkin's disease.
CANCER - 1969, 24, 128-134.
- 74 - THIBAUT PH.
Les carences immunitaires en pneumologie.
PRES. MED. - 1969, 77, 2031-2032.
- 75 - THIBAUT PH.
Actualité des leucémies, des cancers et de la maladie de
Hodgkin.
PRES. MED. - 1970, 78, 1172.

76 - TWORT C.C.

The relation of the tubercle bacillus to lymphadenoma.
J. HYG. - 1924, 23, 260.

77 - VAN ROOYEN C.E.

Etiology of Hodgkin's disease with special reference to
B. Tuberculosis Avis.
BRIT. MED. J. - 1933, I, 50.

78 - WRIGHT E.T. and WINER L.H.

Herpes zoster and Malignancy.
ARCH. DERM. - 1969, 84, 242.

VU, le Président de Thèse :

VU et permis d'imprimer :

Le Doyen de la Faculté
de Médecine de CAEN

